

Prevenirea ITS :

► unica măsură total eficientă este abținerea de la contactul sexual intim. Aceasta se referă, în primul rând la relațiile sexuale, dar orice rană deschisă care se atinge de pielea crăpată, poate avea ca rezultat o ITS. Există mai multe căi de prevenire a ITS.

- pentru o protecție mai mare: inspectați organele genitale ale partenerului;
- spălați-vă organele genitale, după contactul sexual;
- urinați după contactul sexual;
- folosiți spume, geluri și creme contraceptive;
- supuneți-vă unui examen medical regulat.



Reacția adecvată în cazul ITS :

- ◆ Adresați-vă imediat medicului, în vederea tratării.
- ◆ Informați-vă toți partenerii sexuali.
- ◆ Îndemnați-vă partenerul să se trateze.
- ◆ Abțineți-vă de la relații sexuale, cât timp sunteți contagios/contagioasă.



Reține !

„De zece ori pe zi, trebuie să te întreci pe tine însuși !”

(Nietzsche)



GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL
"ELIE RADU"
BOTOȘANI

INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ (ITS)

**Activitate desfășurată
în cadrul proiectului educativ:**

***„Viața adolescentului între familie și
carieră”***

ce se derulează, la :

Grup Școlar Ind. : "Elie Radu"
Botoșani
An școlar : 2007/2008.

ASPECTE LEGATE DE ITS

Descriere :

F - fuseseră cunoscute sub numele de boli venerice (BV);

A - a nu uita, că SIDA este o ITS;

P - prin contact sexual și folosirea intravenoasă a drogurilor se transmit ITS;

T - trebuie să ținem minte, că există peste 20 de ITS și sindroame.

Simptome :

S - schimbări ale pielii(plăgi, iritații, umflături), în zona genitală;

E - existența senzației de iritare(arsură), la urinare;

M - mâncărime în zona genitală;

N - notabile dureri pelviene(femei);

E - existența scurgerilor din organele genitale.

N - nu au simptome multe persoane, dar și acestea pot transmite infecțiile;

U - o persoană specializată, este singura care poate diagnostica și stabili tratamentul pentru persoanele cu ITS.

Complicații :

D - deces.

E - emoționale(teamă, rușine, vinovăție).

C - contaminarea nou - născuților ale căror mame sunt infectate.

E - existența unei sarcini ectopice este fatală embrionului și este periculoasă pentru mamă.

S - sterilitate(incapacitatea de reproducere) - risc crescut.



Agent :

◆ Bacterii, virusuri, protozoare, paraziți, fungi.

Rezervor:

◆ Oamenii.

Loc de intrare/ieșire :

◆ Penis, vagin, rect, gură, fisuri în piele, membrane mucoase, sânge.

Mod de transmitere :

◆ Contactul sexual obișnuit;

◆ Folosirea aceluiaș ac de seringă, cu o persoană infectată;

◆ Gravidă infectată;

◆ Transfuzii sangvine cu sânge infectat(uneori).

Ruperea lanțului ITS :

A - asistența medicală solicitată prompt și urmarea instrucțiunilor medicului.

C - cereți partenerului sexual, să se ducă la medic.

T - discutați cu un cadru medical calificat, despre cum să vă informați partenerul.

Semne și simptome ale ITS :



Oricare din următoarele semne, poate indica unei persoane active sexual, că poate

avea o ITS și că trebuie să consulte un medic;(de reținut, că: în

special femeile,

dar și bărbații, pot avea o ITS fără simptome fizice.):

- ◆ Înroșire sau iritație a organelor genitale;
- ◆ durere la urinat; urină tulbure sau puternic mirositoare;
- ◆ scurgeri neobișnuite din penis sau vagin;
- ◆ rană sau bășici pe sau în jurul organelor genitale, lângă anus sau în gură;
- ◆ mâncărimi excesive sau eczeme;
- ◆ febră sau o senzație generală de rău;
- ◆ un partener sexual cu simptome.